



مدیریت تغذیه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما

تهییه و تنظیم: محمد مهدی طهرانی، مجید بصیرت و فریدون نورقلی پور

آذر ماه ۱۳۹۵

خسارت سرما در گیاهان زراعی

شدت خسارت یخندان یا سرمای زیر صفر درجه در گیاهان زراعی به فاکتورهای متفاوتی مانند مرحله رشد گیاه یا میزان رسیدگی محصول، میزان کاهش دما و طول زمانی که گیاه در معرض این خطر قرار گرفته وابستگی دارد . مقاومت در برابر خسارت یخندان یکی از ویژگی های گیاهان زراعی زمستانه در ماه های سرد زمستان می باشد. با افزایش دما، این مقاومت را از دست داده و با خروج از مرحله زمستان گذرانی شروع به رشد می نماید. با پیشرفت مراحل رشد گیاه، میزان آسیب پذیری گیاه افزایش می یابد و بسته به شدت خسارت یخندان و مراحل مختلف رشد گیاه، تأثیر آن بر عملکرد محصول متفاوت می باشد.

علایم و نشانه های خسارت سرما می تواند در اغلب مراحل مهم رشد گیاهان زراعی زمستانه مشاهده شود . تواتر شب های بسیار سرد پس از روزهای گرم منجر به ایجاد یک نوار رنگی زرد تا سفید یا ارغوانی بر روی برگ های جوان و نوظهور می گردد. به مرور که گیاه با شرایط سرما خوب می گیرد، علایم سرمازدگی کاهش می یابد. بعد از اینکه گیاه در اثر کاهش دما در پاییز به سرما عادت نمود، قادر است در برابر ماه های خیلی سرد نیز با حداقل اثرات زیان بار پایدار بماند . هرچند حتی گیاهان مقاوم شده در برابر سرما نیز هنگامی که دمای خاک به حدود 12°C -برسد، دچار خسارت خواهد شد. درجه حرارت بسیار پائین منجر به مرگ زمستانه در گیاه می گردد. در خاک های خشک نسبت به خاک های مرتبط بیشتر در برابر خسارت سرما آسیب می بیند البته در شمال کشور به خصوص در گلستان و مازندران که بارندگی ها زیاد و سطح آب بالا می باشد احتمال ماندابی شدن خاک زیاد است در این حالت خارج کردن حالت ماندابی اولین اولویت برای جلوگیری از سرمازدگی و عملیات پس از آن می باشد به طوری که پس از بروز عارضه سرمازدگی اگر جاهایی دچار ماندابی شدن خاک باشد آن مزرعه خسارت بیشتری خواهد دید چرا که خاک زودتر از آب گرم می شود و می تواند در باز توانی گیاه پس از بروز سرمازدگی موثر تر باشد. در این شرایط، سرما سریع تر در منطقه ریشه گیاه نفوذ نموده و آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین خسارت سرما در مناطق شیبدار و مرتفع و شیب های رو به شمال شدیدتر می باشد. در مجموع می توان گفت دماهای پایین می تواند به بخش های مختلف گیاه اعم از برگ ها، گره ها و ساقه ها صدمه وارد نماید. در ابتدای خسارت سرمازدگی، برگ ها تیره رنگ می شوند و به نظر می رسد که در اثر جذب آب خیس شده اند . ساقه های خسارت دیده نیز ممکن است ابتدا رنگ پریده، خیس و نرم شده و در نهایت خشن و تیره شوند . این نواحی خمیده و درهم پیچیده شده و موجب واژگونی ساقه می گرددند. اگر ساقه در اثر سرمازدگی کاملاً واژگون نگردد و فقط از ناحیه گره های ساقه خمیده شود، می تواند بعد از گذر از سرما مجدداً رشد نموده و ایستادگی خود را بازیابد. بخ زدن در ابتدای بهار، موجب از بین رفتن نقطه رشگیاه و در اوخر آن، منجر به عقیم شدن خوشه ای گردد اگر نقطه

¹. Growing point

رشد از بین برود، یک برگ رنگی به طور حلقوار دور ساقه ظاهر می‌گردد خوش سرمازده نیز سفید، خشک و بی‌آب به نظر می‌رسد که دارای کرکهای ریز می‌باشد و در نهایت رنگ آن تبدیل به سفید قهوه‌ای ظاهر خوش چروکیده خواهد شد این در حالی است که یک خوش سالم دارای رنگ نسبتاً سفید تا متمايل به سبز و ظاهر شاداب باشند. اصولاً گیاهان سرمازده برخلاف گیاهان سالم نمی‌توانند به طور طبیعی رشد نمایند. برگ‌های آن‌ها رنگ‌پریده شده و مزرعه ظاهر زرد و خشبي پیدا می‌کند.

هنگامی که یخنداش در مرحله به گل رفتن رخ دهد، چند نوع خسارت ممکن است اتفاق بیفتد صفر درجه یا زیر صفر درجه سانتی‌گراد به بساکها که بسیار حساستر از کلاله هستند، صدمه وارد منماید و موجب عقیمی گلچه‌ها می‌گردد. بساکها چروکیده و در هم پیچیده شوند، در حالی که رنگ آن‌ها هنوز زرد مایل به سبز است ۲۴ ساعت بعد از سرمازدگی، این نشانها با کذره بین دستی قابل مشاهده است در چنین شرایطی مقدار داله کم، دانه‌ها چروکیده، دارای وزن و ظرفیت پرورشی پایین می‌باشند علاوه بر این یخنداش به پنجاھ و ساقمهای اولیه گندم صدمه وارد نموده و موجب تحریک رشد پنجه‌های دوم و سوم در گیاه مشهود که در نهایت به تأخیر در برداشت انجامد جدول زیر میزان خسارت سرمازدگی را هنگامی که گیاه بیش از ۲ ساعت در معرض دمای پایین قرار گرفته است را نشانده‌است

مرحله رشد گیاه و میزان خسارت سرمازدگی

مرحله رشد	دما (درجه سانتی‌گراد)	علایم سرمازدگی	تأثیر بر عملکرد
پنجه زدن	-۱۱	زرد شدن و سوختن برگها	کم تا متوسط
ساقه رفتن	-۴/۴	سوختن برگها/ از بین رفتن نقطه رشد	متوسط تا زیاد
آبستنی	-۲/۲	عقیم شدن گلچه‌ها/ رنگ‌پریزی خوشها	عمدتاً زیاد
خوش رفتن	-۱/۱	عقیم شدن گلچه‌ها/ رنگ‌پریزی خوشها/ سفید و بی‌رنگ شدن خوش و برگها	زیاد
به گل رفتن	-۱/۱	عقیم شدن گلچه‌ها/ رنگ‌پریزی خوشها/ سفید و بی‌رنگ شدن خوش و برگها	زیاد
شیری شدن	-۲/۲	بی‌رنگ شدن خوشها، کوچک، چروکیده، کهرنگ و ناصف شدن دانها	عمدتاً زیاد
soft شدن	-۲/۲	دانها بی‌رنگ و چروکیده	کم تا متوسط



شکل ۱- عوارض خسارت سرمازدگی در گندم



شکل ۲- خوش سرمازده در گندم (یخبندان موجب رنگ زرد و ظاهر نمناک پوسته دانه‌ها در خوش شده است)



شکل ۳- خسارت سرمازدگی در نواحی مختلف خوش گندم
(ممکن است همه گلچه‌ها همزمان دچار سرمازدگی نشوند)

توجه به تاریخ کاشت، انتخاب صحیح ارقام و تهیه بستر مناسب بذر از طریق کاشت بذر در بستری از کاه و کلش از جمله راههای مدیریت خسارت‌های ناشی از تنفس سرما در گندم مبییند

مدیریت تعذیه نیز از جمله عوامل مهم در کاهش خسارت ناشی از سرما محسوب می‌شود. مقدار مصرف کود نیتروژن در جلوگیری از خطر سرمازدگی می‌تواند مؤثر باشد. گیاهانی که دارای کمبود نیتروژن هستند، اغلب از نظر تاریخ خوش رفتمندانه با گیاهانی که نیتروژن کافی دریافت داشته‌اند، ندارند اما ظاهر گیاه کوچک تر و عملکرد آن پایین‌تر می‌باشد. مصرف کود نیتروژن موجب افزایش رشد رویشی و شادابی گیاه گردیده، ساقه‌ها آبدار و مستعد سرمازدگی می‌شوند. مصرف کود نیتروژن باید قبل از مرحله ساقه رفتمندانه به منظور دستیابی به عملکرد حداکثر انجام گردد. از مصرف بیش از حد کود نیتروژن در پاییز باید اجتناب نمود، اما مقادیر کافی فسفر جهت رشد قوی ریشه توصیه می‌شود. گیاهانی که به اندازه کافی پتابسیم دریافت نکرده‌اند، اغلب به سرمازدگی حساس‌تر هستند که این امر به کمبود آب در سلول مربوط می‌شود. بنابراین کافی نبودن میزان پتابسیم، عاملی است که به افزایش خطر سرمازدگی منجر می‌گردد.

از طرفی با افزایش مواد آلی محلول از قبیل قندها و پروتئین‌ها به سلول‌های گیاهان زراعی، می‌توان مقاومت آن‌ها را در برابر سرمازدگی افزایش داد. استفاده از محلول‌های محرک رشد گیاه^۲ در مراحل قبل از پنجه زنی، مرحله پنجه زنی و ساقه رفتمندانه کمک شایانی به افزایش مقاومت به شرایط تنفس‌های سرمایی بیانجامد.

استفاده از مواد آلی و هوموک اسید نیز با سازوکارهایی می‌تواند تا حدودی مانع سرمازدگی شود. مکاریسم نخست مربوط می‌شود به افزایش فعالیت میکرووارگاریسم‌های خاک که خودبه‌خود سبب گرم شدن خاک در اطراف ریشه می‌شود. اگرچه چرخش شریه گیاهی در درون آوندها در فصل زمستان کند و بطئی است، اما همین چرخش کند هم می‌تواند تا حدودی گرمای ریشه را به قسمت‌های هوایی منتقل کند. دومین سازوکار مربوط می‌شود به حفظ بیشتر رطوبت خاک که به دلیل بالا بودن گرمای ویژه آب مقدار کالری بیشتری در درون خاک ذخیره می‌شود. در طول روز آفتاب به سطح زمین می‌تابد و آن را گرم می‌کند و در شب خاک خشک به سرعت گرمای را از دست می‌دهد. اما خاک مربوط که مقدار بیشتری کالری ذخیره کرده است آهسته‌تر خنک می‌شود، در نتیجه احتمال سرمازدگی کاهش می‌کند. سومین سازوکار استفاده از مواد آلی و هیومیکی برای مقابله با سرمازدگی این است که این ترکیبات رنگ‌تخیه‌ای به خاک می‌دهد و در نتیجه انرژی خورشیدی بیشتر به خاک جذب می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که پیروی از اصول مدیریت بهینه تعذیه یه گندم و استفاده از کودهای حاوی عناصر غذایی، مواد آلی و محرک‌های رشد گیاه در قالب یک برنامه مدیریتی و برنامه ریزی شده که عمدتاً از اول فصل رشد آغاز می‌گردد، علاوه بر حصول عملکرد و کیفیت محصول، گیاه را در برابر بسیاری از تنفس‌های زنده و غیر زنده از جمله

² Biostimulants

سرمازدگی مقاوم می سازد . اینگونه نهاده ها اصولاً می بایست در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم مصرف شده و توسط سلول های گیاهی به متابولیت های مفید برای رشد و مقابله با تنفس تبدیل شوند. لذا استفاده از اینگونه نهاده ها در زمان کوتاهی قبل از مواجهه با تنفسهایی مانند سرمازدگی کارایی لازم را نداشته و گاهآ برابر کاهش عوارض ناشی از سرمازدگی در دوره پس از وقوع سرما می توانند مؤثرتر باشند.

دستورالعمل کوددهی گندم برای مقاوم سازی و باز توانی گیاه پس از سرمازدگی

شیری یا خمیری شدن دانه ها	دانه بندی	قبل از ظهرور خوشه	ساقه دهی	تمکیل پنجه زنی	شروع پنجه زنی	دومین آبیاری	قبل از کاشت	مراحل فنولوژیکی نوع کود
محلولپاشی	محلولپاشی		۱۰ درصد بیشتر از دستورالعمل*	۱۰ درصد بیشتر از دستورالعمل *	مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳		کود نیتروژنی
							مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	کود فسفری
							مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	کود پتاسیمی
			محلول پاشی*	محلول پاشی*			بذرمال-صرف خاکی	کودهای حاوی عناصر ریزمغذی به ویژه روی
محلول پاشی	محلول پاشی - کودآبیاری		۵ تا ۱۰ کیلو گرم در هکتار کودآبیاری*					کودهای قابل حل با پتاسیم بالا
			محلول پاشی*	۱۰ کیلو گرم در هکتار کودآبیاری*		کودآبیاری		کودهای قابل حل با فسفر بالا
							توسط دیسک با خاک مخلوط شود	کودهای آلی
							بذرمال	کودهای زیستی
			۵ تا ۶ لیتر در هکتار کودآبیاری*			کودآبیاری	بذرمال	اسیدهای هیومیک
				محلول پاشی*	محلول پاشی		بذرمال	محرك های رشد گیاهی (جلبک یا اسید آمینه)

توجه : در صورت بروز خسارت سرمازدگی عملیات هایی که در جدول بالا با ستاره نشان داده شده است برای احیاء محصول پس از مساعد شدن شرایط اقلیمی و شروع رشد گیاه اولویت انجام دارد.

برای بازتوانی گندم پس از وقوع سرمازدگی بهتر است برای جب ران از بین رفتن اندام هوایی گیاه پس از شروع رشد در اوخر زمستان نسبت به مصرف نیتروژن اقدام نمود. در این وضعیت برای جبران خسارت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیتروژن بیشتر به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی از جمله هیومیک اسید، اسید آمینه یا عصاره جلبک توصیه می شود تا حرکت گیاه تسريع گردد. در صورتی که قبل کود های پتسه و فسفاته در زمان کشت مصرف نشده است بهتر است این کودها به صورت سرک در آب آبیاری مصرف گردد.

خسارت سرمازدگی در کلزا

کلزا محصول مناطق معتدل می باشد و در اثر اصلاح و سازگاری که انجام گرفته است کثیر لایر مناطق میسر می باشد. بیش از ۹۰ درصد بذور کلزا در دمای ۲۵-۲ درجه سانتی گراد در مدت ۱-۲ روز جوانه می زند در حالیکه در درجه حرارت های ۱۱-۱۴ روز و دمای مطلوب (۲۰-۲۵) یک روز می باشد درجه حرارت پایه برای این گیله درجه سانتی گراد و درجه حرارت مطلوب ۲۵-۳ درجه می باشد. درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد را این گیاه برای مدت کوتاهی می تواند تحمل کند و چنانچه درجه حرارت مرحله رویشی بالاتر از مرحله گلدهی و دانه بستن باشد عملکرد نهایی افزایش می یابد.

چرخه زندگی کلزا پاییزه دارای دو مرحله رویشی که اندامهای رویشی در پاییز شکل می گیرند و با گذشت مرحله خواب زمستانه در اوایل بهار رشد مجدد را آغاز کرده که مراحل رشد زایشی انجام می کنند و با گذشت مرحله سرما افزایش می دهد که زمستانه از زمانی که درجه حرارت روزانه ۳ یورو جه می رسد شروع و در بهار وقتی که هوای درجه سانتی گراد شد پایان می پذیره ای اگر در بهار گرم شد و سپس یخنداش رخ داد باعث خسارت به این محصول می شود تا ۱۲ درجه سانتی گراد (بستگی به مرحله رشد نمود و درجه سازگاری و رقم کلزا، این محصول سوکاچتا ۱۵- را تحمل می کند و در حالتی که زمین از برف پوشیده شده است تحمل به سرما در دمای پایین نیز می باشد دمای ۷- تا ۱۵- درجه سانتی گراد برای برگها کشنده اسلما گیاهانی که سیستم ریشه ای توسعه یافته ای دارند و نقاط رشدی توسط برگه پوشیده شده است، در دمای پایین نیز زنده می مانند



شکل ۴- آثار خسارت سرما بر روی کلزا یک روز بعد از سرمهای ۹۳/۱۲ با حداقل دمای منفی یک درجه سانتی گراد در منطقه نیشابور



شکل ۵- عکس سمت راست کلزای خسارت دیده در سرما و از بین رفته و عکس چپ کوتیلیدون ها خسارت دیده اما ساقه و نقطه شد آتی سالم می باشند و این گیاه زنده خواهد ماند

سرماهای قبل از سبزشدن گیاه تقریباً کشنده هستند و برای منظور برای سرعت دهی به جوانه زنی و خروج از خاک میباشد از روش بذر مال برای سریع سبز شدن استفاده کرد . معمولاً پس از بروز سرما بدليل آسیب زیاد گیاهچه کار

زیادی نمی توان انجام داد . انواع بذر مال های تجاری حاوی عنصر روی و یا روی و فسفر و یا ترکیبات اسید هیومیک تقویت شده با روی یا فسفر برای تسريع جوانه زنی قابل توصیه می باشند.



شکل ۶- خسارت سرمازدگی در کلزا گیاهچه سمت چپ به دلیل از بین رفتن ساقچه از بین می رود اما گیاهچه سمت راست به دلیل سالم ماندن ساقچه و نقطه رشد انتهایی به رشد خود ادامه خواهد داد.

دستورالعمل کوددهی کلزا برای مقاوم سازی و باز توانی گیاه پس از سرمazăدگی

بعد از گلدهی	غنجه دهی	ساقه دهی	تکمیل رزت	تشکیل رزت	دومین آبیاری	قبل از کاشت	مراحل فنولوژیکی
							نوع کود
محلولپاشی		۱۰ درصد بیستر از دستورالعمل *	۱۰ درصد بیستر از دستورالعمل *	مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳		کود نیتروژنی
						مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	کود فسفری
						مطابق دستورالعمل ۱۳۹۳	کود پتاسیمی
		محلول پاشی *	محلول پاشی *			بذرمال-صرف خاکی مطابق دستورالعمل ۹۳	کودهای حاوی عناصر ریزمغذی به ویژه روی
	- محلول پاشی- کودآبیاری		۵ تا ۱۰ کیلو گرم در هکتار کودآبیاری *				کودهای قابل حل با پتاسیم بالا
		محلول پاشی *	۵ تا ۱۰ کیلو گرم در هکتار کودآبیاری *		کودآبیاری		کودهای قابل حل با فسفر بالا
						توسط دیسک با خاک مخلوط شود	کودهای آلی
						بذرمال	کودهای زیستی
		۵ تا ۶ لیتر در هکتار کودآبیاری *			کودآبیاری	بذرمال	اسیدهای هیومیک
			محلول پاشی *	محلول پاشی		بذرمال	محرك های رشد گیاهی (جلبک یا اسید آمینه)

توجه : در صورت بروز خسارت سرمایزدگی عملیات هایی که در جدول بالا با ستاره نشان داده شده است برای احیاء محصول پس از مساعد شدن شرایط اقلیمی و شروع رشد گیاه اولویت انجام دارد.

برای بازتوانی کلزا پس از وقوع سرمایزدگی بهتر است برای جبران از بین رفتن اندام هوایی گیاه پس از شروع رشد در اوآخر زمستان نسبت به مصرف نیتروژن اقدام نمود . در این وضعیت برای جبران خسارت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیتروژن بیشتر به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی از جمله هیومیک اسید ، اسید آمینه یا عصاره جلبک توصیه می شود تا حرکت گیاه تسريع گردد . در صورتی که قبل کود های پتابه و فسفاته در زمان کشت مصرف نشده است بهتر است این کودها به صورت سرک در آب آبیاری مصرف گردند.