

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

تاریخ ثبت	دز مصرف	کارنس	محصول	بیماری	شرکت	فرمولاسیون	درصد	نام تجاری	نام عمومی	
92/3/27	0/5 لیتر در هکتار	42 روز	گندم	بیماری فوزاریمی سنبله	ب آ اس اف	SC	49/7%	رکس دو	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل	1
96/6/27	0/5 لیتر در هکتار	42 روز	گندم	زنگ رزد						
97/7/16	0/5 لیتر در هکتار		چغندر قند	سفیدک پودری						
88/9/30	مزرعه: یک لیتر در هکتار گلخانه: 0/75 در هزار	خيار: 2 روز گوچه فرنگی: 2 روز	جالیز- مزرعه گلخانه	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	32/5%	ارتیواتاپ	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	2
99/10/22	یک لیتر در هکتار		چغندر قند	لکه برگی سروکسپورایی						
97/7/16	0/75 در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	-	خيار گلخانه	سفیدک پودری	بارزگانان سرای سپند	SC	32/5%	سفیر	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	3
97/7/16	0/75 در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	-	خيار گلخانه	سفیدک پودری	کاوش کیمیاى کرمان	SC	32/5%	دیفوروبین	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	4

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

92/8/27	0/75 لیتر در هکتار	35 روز	گندم	زنگ زرد	سینجنتا	SC	28%	آمیستار اکسترا	آزوکسی استروبین+ سپیروکونازول	5
92/8/27	0/6 لیتر در هکتار	30 روز	گندم	زنگ زرد	بایراگ	EC	46%	فالکن	اسپیروکسامین+ تبو کونازول+ تریادیمنول	6
94/3/25	0/0-7/8 لیتر در هکتار	30 روز	گندم	فوزاریوم سنبله						
1400/6/1	3/5 در هزار	3-7 روز	خیار	سفیدک کرکی	پرتونار (ویمال)	SC	35%	اکسی کلرور پرتونار	اکسی کلرور مس	7
1400/6/1	3/5 در هزار	3-7 روز	خیار	سفیدک کرکی	کاوش کیمیای کرمان (شیام کمیکالز)	SC	35%	اکسی کلرور کاوش	اکسی کلرور مس	8
94/6/23	3 کیلو گرم در هکتار	5 روز	خیار	سفیدک داخلی	اگریا	WP	43/95%	کوپروسیت سی	اکسی کلرور مس+ سیمو کسانیل	9
1400/9/29	گلخانه: 6 در هزار فضایی باز: 6 کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی	3 روز	خیار	سفیدک کرکی	سینجنتا	WG	16/19%	ریدمیل گلد آر	اکسی کلرید مس+ مفنوکسام (متالاکسیل ام)	10

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	به فاصله 14 (روز)									
99/11/6	2 در هزار	-	گردو	آنتراکتوز	رها اندیش کاوان	WG	45%	ردشیلد	اکسید مس	11
91/6/20	1 در هزار	15 روز	درختان میوه دانه دار	آتشک						
90/4/13	2/5 در هزار	15 روز	هلو	پیچیدگی برگ						
94/7/6	1 کیلوگرم در هکتار	15 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	75%	نوردوکس	اکسید مس	12
96/4/19	130 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-----	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه برنج						
97/10/17	0/7 در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	1 روز	خیار (فضای باز و گلخانه)							
99/2/8	0/7 در هزار در فواصل زمانی 7-10 روز جهت	1 روز	هندوانه							

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

13	آمتوکترا دین+ دیمتومورف	اوروگو	52/5%	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی			کنترل بیماری
99/4/30	یک در هزار در هزار در فواصل زمانی 7-10 روز جهت کنترل بیماری	1 روز	انگور						
86/10/10	2% وزن غده	-----	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونیاپی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	50%	رورال	اپرودیون
99/4/30	4 لیتر به ازای 1000 کیلوگرم غده بنری	---	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونیاپی ساقه و شوره سیاه غده	پاک سم ایرانیان Jiangsu) (Lanfeng	SC	26%	رستاپ	اپرودیون 175 + کاربندازیم 85 (گرم /لیتر)
96/3/1	1/25 لیتر در هکتار	14 روز	برنج	بلاست	نیهون نو هیاکو	EC	40%	فوجی وان	ایزوپروتیولون
92/4/17	0/0-5/75 کیلوگرم در هکتار	1 روز	خیار	سفیدک پودری					
93/3/12	750 گرم در هکتار	7 روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	40%	بلکیوت	ایمنوکتادین تریس
95/8/24	0/75 در هزار	7 روز	انگور	سفیدک پودری					
97/2/24	180 گرم در هکتار	2 روز	برنج	بلاست	گیاه پر نیان اطلس (دکیانگ بیولوژی)	WP	5%	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس
98/8/27	در سه مرحله	ندارد	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریوی	روبان تیسان	SC	10 ⁸	پارس باسیل	باسیلوس از نسپیس

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	به ترتیب با دزهای 5، 5 و 4 لیتر در هکتار		گلخانه							
98/10/9	5 در هزار	ندارد	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	بایرآلمان	SC	10 ¹²	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس	20
99/4/30	200 گرم در هکتار، 45 و 90 روز پس از کاشت	ندارد	چغندر قند	پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه	زیست فناوری سبز	پودر مرطوب	10 ⁷	روبین 1	باسیلوس سوبتیلیس	21
93/12/4	10 در هزار دو مرحله	7 روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	18%	میشو بردوکس	بردو	22
94/10/7	2 درصد محلول پاشی توأم با پانسما شانکر با بردو کیمیا 8 درصد	7 روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	18%	بردو کیمیا	بردو	23
96/11/16	10 در هزار	7 روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسم	SC	18%	بردو بهسم	بردو	24
96/2/25	8 در هزار در مرحله جوانه و 5 در هزار در مرحله 5 درصد، 50 درصد و 100 درصد گل	7 روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	18%	بردوسیف	بردو	25

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

97/9/26	5 در هزار		خيار(گلخانه)	سفیدک داخلی	سبز آور نگین فلات	SC	18%	کبردوسیف		
98/3/27	8 در هزار		هلو	پیچیدگی برگ	سبز آور نگین فلات	SC	18%	بردوسیف		
96/3/1	5-8 در هزار در زمان ریزش برگها در پاییز و تورم جوانهها در بهار	7 روز	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	20%	بردو سمیران	بردو	26
97/9/26	5 در هزار	-	خيار(گلخانه)	سفیدک داخلی	اکسین شیمی آدان	SC	20%	بردوکسین	بردو	27
97/9/26	5 در هزار	-	خيار(گلخانه)	سفیدک داخلی	پرتونار	SC	20%	بردوتکس	بردو	28
98/3/27	9 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	20%	بردوتکس		
97/3/28	5 در هزار	7 روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس	بردو	29
97/8/14	10 در هزار در مرحله جوانه و 4 در هزار در مراحل 5، 50 و 100 درصد گل	7 روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
98/3/27	2/5 در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	80%	سولفیکس		
98/3/27	10 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
97/9/26	5 در هزار	-	خيار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
97/12/13	9 در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	20%	بردوجی	بردو	30

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

99/4/30	15 در هزار	-	زردالو	غربالی	فرآورده های طیف سبز	SC	18%	بردوظیف	بردو	31
1400/9/15	5 لیتر در هکتار	3 روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرسم کود (مانیکا ایتالیا)	SC	10%	MANIFLOW	بردومیکسچر	32
99/6/24	3 کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	7 روز	خیار	سفیدک کرکی	خزرسم کود (0)	WP	33%	توتور	بردومیکسچر (CU) +15% فوزتیل آلومینیوم 18%	33
98/10/23	یک در هزار (حداکثر و بار در سال)	-	گوجه فرنگی	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس (Shandong Kangqiao)	WG	38%	یونیلیس	بوسکالید+ پیراکلو استروبین	34
89/9/29	0/7 در هزار، مناطق خشک، 1 در هزار مناطق مرطوب	7 روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	38%	بلیس	بوسکالید+ پیراکلو استروبین	35
97/12/13	7 در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش ها و حداکثر دوبار در سال	-	سیب درختی	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	38%	بلیس	بوسکالید+ پیراکلو استروبین	36
94/12/10	0/5 کیلوگرم در هکتار	3 روز	پودری گوجه فرنگی	آلترناریا						

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

95/3/17	0/5 کیلوگرم در هکتار	3 روز	سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	33/4%	سیگنوم	بوسکالید+ بپراکلوستروبین	37
98/11/28	1/5 در هزار و در تناوب با سایر قارچ- کش ها و حداکثر دوبار در سال	3 روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری						
99/3/12	1/5 کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله 14 روز تا برداشت استفاده شود.	3 روز	کاهو	افتادگی برگ						
1400/7/26	1/25 در هزار	3 روز	خیار	کپک خاکستری						
89/9/29	0/5 در هزار	7 روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	38	
96/9/13	0/4 در هزار	-	خیار							
98/4/10	0/5 در هزار	-	گوجه فرنگی							

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

			(فضای باز)							
90/12/1	5 در هزار	-	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیا سبز آور	SP	85%	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	39
97/12/13	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی (آستک)	EC	25%	بهتیل	پروپیکونازول	40
99/6/24	400 میلی لیتر در هکتار	21	گندم	سپتوریوز	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	EC	30%	هاربور	پروپیکونازول 15 درصد + دیفنوکونازول 15 درصد	41
89/3/10	10-15 میلی- لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی						
89/9/1	20 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم		بایراگ	FS	40%	لاماردور	پروتیوکونازول+ تیبوکونازول	42
96/4/19	15 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار						
92/7/8	3 لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل	3 روز	خیار	بوته میری	بایراگ	SL	84%	پرویکور انرژ ی	پروپاموکارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	43

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	عامل بیماری فوق به مقدار 0/3 لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک									
92/8/27	2 در هزار	1 روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	68/75%	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولاید	44
94/7/6	1/2 لیتر در هکتار	7 روز	سیب زمینی							
94/7/6	2/5 لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	45%	پروکسانیل	پروپامو کاب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	45
96/11/30	1 در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و 0/75 در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	-	خیار	بوته میری <i>Pythiumaphniderm atum</i>	اگریفار	SL	72/2%	پروپلنت	پروپامو کاب هیدروکلراید	46
97/12/13	نیم لیتر در هکتار		گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	35/5%	اینور	پروپیکونازول+فلوکساید روکساد+پیراکلو استروبی ن	47
92/8/27	0/9 گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	50%	آکورد	پروکلراز	48

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

86/2/3	1/25 در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایراگ	WP FS	25%	مونسرن	پنسیکرون	49
99/4/30	1-1/25 در هزار (ضد عفونی بذر)		سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده						
97/10/17	0/35 در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	جیانگ سوگرین سای (برزگر برجسته)	DF	18/7%	پیرادیم	پیراکلو استروبین+ دیمتومورف	50
99/3/12	1/5 لیتر در هکتار		گندم	سفیدک پودری	ب آ اس اف	EC	22/5%	پریاکسور	پیراکلو استروبین+ فلوکساپیر وکساد	51
98/11/28	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ- کش ها و حداکثر دوبار در سال	-	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	گیاه پر نیان اطلس (Safa Tarim)	SC	30%	میلیس	پیری متانیل	52
1400/9/15	4-/3 در هزار در طول فصل	-	خیار گلخانه	عامل پیشگیرانه بیماری	بازارگان کالا	WP		پلی ورسوم	Pythium Oligandrum	53

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت			گیاهچه میری	(Biopreparaly)				Drechsler	
97/2/30	60 کیلوگرم برای بذر مال کردن 4 تن غده سیب زمینی در هکتار	ندارد	سیب زمینی	پژمردگی ورتیسیلیومی	بهاران دشت ساحل	ذرات جامد قابل انتشار در آب	10 ⁹	تالارومین	تالارومیسس فلاووس	54
94/3/11	1 لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلووتنیایی	بایر آگ	EW	25%	فولیکور	تبوکونازول	55
95/9/29	50 میلی لیتر برای یکصد کیلورم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیستر فیلد	FS	6%	آرتمیس	تبوکونازول	56
97/12/13	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گل سم گرگان (نینگ بوسانجوری)	EW	25%	تبوکور	تبوکونازول	57
97/12/13	4 لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گیاه پر نیان اطلس (تاید کراپ ساینس)	SC	40%	تایدتیو	تبوکونازول	58
89/10/13	100 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم							
89/10/13	30 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم	-		سیاهک آشکار	ایزاگرو	LS	12/5%	لوسپل	تبوکونازول	59

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	بذر									
98/10/23	یک در هزار	-	رز	سفیدک پودری	آریاشیمی (Ningbo Sunjoy + Jiangsu)	SC	32%	آذیلون	تبوکونازول + آزوکسی استروبین	60
1400/9/1	6 دهم لیتر	-	گندم	سفیدک پودری	ساعی گل تهران Jiangsu) Mindleader crop (science	SC	30% (345گرم/لیتر)	پیلارتب	تبوکونازول + پیراکلو استروبین	61
88/8/11	0/5 لیتر در هکتار در مزرعه و 0/4 در هزار در گلخانه	3 روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	10%	دومارک	تتراکونازول	62
92/3/27	0/3 در هزار	14 روز	سیب							
90/7/4	0/1-8 لیتر در هکتار	21 روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	12/5%	امی ننت	تتراکونازول	63
89/3/10	150 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	DS	7/5%	بایتان	تریادیمنول	64
89/3/10	20 میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	20%	رنال	تری تیکونازول	65

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	م بندر									
88/8/11	200 گرم در هکتار	1 روز	جالیز- مزرعه							
96/5/2	250 گرم در هکتار	1 روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	50%	فلینت	تری فلوکسی استروبین	66
92/3/6	160 گرم در هکتار	21 روز	برنج	بلاست						
94/5/12	0/0-2/3 در هزار	14 روز	سیب	لکه سیاه						
95/6/1	0/3 در هزار	14 روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	75%	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	67
95/6/1	200 گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری						
96/9/13	160 گرم در هکتار	21 روز	برنج	شیت بلایت						
98/11/14	160 گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند پارس CAC) (Nantong	WG	75%	فلونازول	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	68
98/11/14	320 میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان Sunjoy& CAC) (Nanton	SC	37/5%	تیلما	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	69

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

96/2/25	0/2 در هزار	14 روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	50%	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	70
96/3/1	0/2 در هزار	14 روز	سیب	لکه سیاه						
96/3/1	0/2 در هزار	3 روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری						
96/5/2	200 میلی لیتر در هکتار	5 روز	گوچه فرنگی- مزرعه							
1400/7/26	4 دهم در هزار	-	خیار	کیک خاکستری						
99/10/9	یک در هزار	-	درختان سیب	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان (نیون سودا)	EC	15%	تریفمین	تری فلومیزول	71
99/10/1	75 صدم در هزار	14 روز	هلو	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان (نیون سودا)	WG	18/4%	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	72
1400/4/14				مومیایی						
96/11/30	0/3 در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	19%	ساپرول	تریفورین	73
98/12/28	0/4 تا نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	12%	اینشور پرفرم	تریتیوکونازول +پیراکلو استروبین	74
1400/9/1	نیم در هزار			سیاهک آشکار						
80/3/21	-	-	مرکبات	انبارداری	---	WAX	0%/7	سیترازول آ	تیابندازول+ ایماز الیل	75
99/3/26	300 سی سی در هکتار در	21 روز	برنج	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان	SC	24%	آچمز	تیفلوزامید	76

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	تناوب یا سایر قارچ کش ها				Shandong) (kangqiao)					
90/3/30	0/0-5/4 کیلوگرم در هکتار	21 روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	72/5%	ویستا	تیوفانات متیل+ تری سیکلازول	77
97/6/27	500 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	47/9%	رکس دو	تیوفانات متیل+ اپوکسی کونازول	78
91/2/9	30-40 گرم برای هزار گیاه	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه (کوپرت هلند)	WP	10 ⁹	تریانوم پی	تریکودر ماهارزیانوم	79
91/2/9	30-40 گرم برای هزار گیاه	ندارد	خیار گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه (کوپرت هلند)	WP	10 ⁹	تریانوم پی	تریکودر ماهارزیانوم	80
97/9/21	15-20 کیلوگرم در هکتار	ندارد	طالبی	پژمردگی فوزاریومی	گیاه (کوپرت هلند)	G	10 ⁹	تریانوم پی	تریکودر ماهارزیانوم	81
97/9/21	250-375 گرم در متر مکعب	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه (کوپرت هلند)	G	10 ⁸	تریانوم پی	تریکودر ماهارزیانوم	82
89/3/10	200 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا					
89/9/1	100 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم			FS	3/63%	دیویند استار	دیفنو کونازول+ سایپرو کونازول	83
97/8/14	1 در هزار	-	خیار در شرایط	سفیدک پودری	سینجنتا	DC	14%	سیدلی تاپ	دیفنو کونازول+	84

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	(عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)		گلخانه‌ای						سیفلوفنامید	
99/10/22	نیم در هزار	3 روز	خيار گلخانه‌ای	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	12/5%	داگونیس	دیفنوکونازول+ فلوکساپیر وکساد	85
1400/9/22	شش دهم در هزار		سیب							
94/12/10	2 لیتر در هکتار	3 روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	EC	11/2%	کابریو دو	دیمتومورف+ پیراکلوستروبین	86
94/8/25	2 کیلوگرم در هکتار	7 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	WG	69%	اکروبات ام زد	دیمتومورف+ مانکوزب	87
94/3/11	1 لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکروتنیایی	سینجنتا	SC	42%	آلتو کمبی	سایپروکونازول+ کاربندازیم	88
91/3/8	4 تا 5 در هزار	3 روز	خيار - گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	40%	رانمن	سیازوفامید	89
94/7/6	150 میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	بازدگی						
96/5/2	1/5 در هزار	3 روز	خيار - گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	10%	رانمن	سیازوفامید	90
97/10/17	0/6 در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره	-	خيار (گلخانه)	سفیدک داخلی	شانداگ هایلر (بازرگانان سرای سپند پارس)	SC	20%	رگنانت	سیازوفامید	91

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	تولید ممنوع (است).									
92/4/17	3 کیلوگرم در هکتار	1 روز	خیار	سفیدک پودری	بیستر فیلد	WG	80%	سولفولاک	سولفور	92
92/8/27	2/5 در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	80%	گوگرد سمیران	سولفور	93
93/6/10	3/75 در هزار	20 روز	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	40%	سولفور ارکیده سازان	سولفور	94
99/3/12	3 در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	-	خیار گلخانه	سفیدک پودری	آریا شیمی (کروماندل)	DF	80%	پارومی دی	سوافور	95
98/10/9	3 در هزار	-	توت فرنگی	کیپک خاکستری	رهروان رویش سبز	SP	62/2%	سراکوئینت	سولفات مس +102 فسفیت پتاسیم 519	96
97/12/13	4/کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	-	پیاز	سفیدک داخلی	خزر سم کود Zhejiang Sega	WG	52/5%	اکولایزر	فاموکسادون+ سیموکسانیل	97
99/6/24	400گرم در هکتار	14 روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	زرین خوشه جنوب Shanghai) (Shengnong	WG	52/5%	زرین پرو	فاموکسادون+ سیموکسانیل	98
99/4/9	2/5 در هزار	14 روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان (AGRO OAT)	EC	5%	گاتن	فلوتیانیل	99

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

97/10/17	3لیتر در هکتار(در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاربیومی	جیانگ سو (کیمیا سبزینه پویا)	SC	25%	لیانگدی	فناماکریل	100
1400/4/28	15 صدم در هزار	21 روز	هلو	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	30%	سرکادیس	فلوکساپیروکساد	101
1400/9/1			انگور							
92/12/5	2/5 در هزار	30 روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	80%	الیت	فوزتیل آلومینیوم	102
96/5/2	2 در هزار	14 روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	80%	رودر	فوزتیل آلومینیوم	103
99/10/22	2/5 در هزار	14 روز	پسته	انگومک	گل سم گرگان LiminChemical	WP	80%	فیتوکیور	فوزتیل آلومینیوم	104
95/8/24	2-2/5 در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	7 روز	انگور	سفیدک داخلی	بایر آگ	WG	71/1%	پروفایلر	فوزتیل آلومینیوم+ فلوپیکولید	105
87/5/2	0/2 در هزار	4 روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	50%	استروبی	کروزکسیم متیل	106
1400/9/15	4 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	برزگر برجسته Agro life) Science (corporation	WP	85%	کوپراکسی کلرید مس برزگر	کوپراکسی کلرید مس	107
98/4/10	نیم در هزار	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	پروبلت فیتو اسپانیا (سبا کوشا کشت)	SL	37/5%	بلتانول	کینوسول	108

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

97/10/17	0/7 در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و 3 بیش از 4 هار نوبت 5 در یک دوه تولید ممنوع است.	1 روز	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	سینجنتا	SC	50%	کاربیل استار	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	109
93/4/2	30 گرم در یک لیتر آب و کاربرد به روش رنگ آمیزی	-	مرکبات	گموز	ماسو	WP	65%	آلیادو سی تی ال	مانکوزب+ کلروتالونیل+ سیمو کسانیل	110
97/9/26	3/ در هزار) به صورت تناوبی با قارچ کش های دیگر)	-	سیب درختی	لکه سیاه	ناگار جونا اگری کم (سبز محصول داتیس)	WP	40%	آتیس	مایکلو بوتانیل	111
86/8/28	یک بسته 7 گرمی برای نگهداری 5 کیلوگرم انگور	-	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوشه	پد کاغذی	7 گرم متا بیسولفیت	سولفور پد	متا بی سولفیت سدیم	112
96/4/19	2 در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی	7 روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	72%	داونی جی	متالاکسیل+ مانکوزب	113

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار 200 گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک									
93/2/15	2 در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار 200 گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	7 روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	72%	رزالاکسیل	متالاکسیل+ مانکوزب	114
94/7/6	3 کیلوگرم در	7 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی						

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

	هکتار									
99/3/12	2/5 کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک (Leeds)	WP	72%	منکوماکسیل	متالاکسیل 8 درصد+ مانکوزب 64 درصد	115
99/9/17	دو در هزار	-	خیار گلخانه	بوته میری	ایرمان (UPL)	WP	72%	منکولاکسیل	متالاکسیل 8 درصد+ مانکوزب 64 درصد	116
99/4/9	2/5 در هزار	-	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکست شیمی Industrias) Quimicas (Valles	SC	22%	آر متیل آر	متالاکسیل 3/5 درصد + هیدروکسید مس 18/5 درصد	117
99/9/17	2 در هزار	-	خیار	بوته میری	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang) (Heben	GR	5%	ریدومکس	متالاکسیل	118
99/9/17	2 در هزار	-	خیار	بوته میری	گیاه Zhejiang) (Heben	GR	5%	ردوکسیل	متالاکسیل	119
95/6/29	3-4 در هزار	صفر روز	خیار - گلخانه	سفیدک داخلی	J I Biotech	SL	53%	فسفایت	مونو و دی پتاسیم اسیدفسفونیک	120

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا ابتدای دی ماه 1400

98/4/10	1/5 لیتر در هزار لیتر آب	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	سینجنتا	EC	44/6%	یونیفورم	متالاکسیل ام (مفنوکسام)+ آزوکسی استروبین	
95/10/27	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دودر هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار 2 در هزار	10 روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	30%	تاچی گارن	های مکسازول	121
1400/9/15	1/2 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	بازارگان کالا (ISAGRO)	WG	28%	BADGE	هیدروکسید مس + کوپراکسی کلرید مس	121
96/8/29	مزرعه: 10 در هزار گلخانه: 7/5 در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	بازرگان کالا Jh biotech	SL	83%	میلدی کیور	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	122
98/10/9	4 در هزار	ندارد	توت فرنگی	کپک خاکستری	روماک گستر غرب	EC	60%	روماک	اسانس روغن پنبه	123